【No. 60】 図のようなグラフにおいて、頂点に存在する粒子が、1秒ごとの離散時刻、隣接する頂点に等確率で移動するランダム・ウォークを考える。粒子が頂点Oに存在する定常確率はいくらか。
ただし、粒子はグラフ上に1つだけ存在するものとする。

1. $\frac{1}{3}$ 2. $\frac{1}{4}$ 3. $\frac{1}{5}$ 4. $\frac{1}{6}$ 5. $\frac{1}{7}$

まず対称性に気付くことでしょう。A~Fをまとめてしまえば、非常に簡単になります。なお、A~Eにいる場合、次にOに移る確率と、外周にとどまる確率は1:2ですが、Oに移れば、その次は選択の余地無く、外周に戻ります。そこで、選択3回に1回、「2秒かけて外周に戻る」と考えると、「1秒後外周」「1秒後外周」「2秒後外周に戻る」の3つが公平に起こると考えられます。こうすると、4秒に1度ずつOに戻ることが直感的にも理解できます。

解答

n 秒後にOにいる確率を a_n 、O以外にいる確率を b_n とする。このどちらか以外なので、常に $a_n + b_n = 1$ が成立する。Oにいれば1秒後には必ずO以外にいて、O以外にいれば、どこにいても1秒後には確率 $\frac{1}{3}$ でOにいる。したがって、漸化式として、次の式が成立する。

$$\begin{cases} a_{n+1} = \frac{1}{3}b_n \\ b_{n+1} = a_n + \frac{2}{3}b_n \end{cases}$$

上の式に $b_n = 1 - a_n$ を代入すると、

$$a_{n+1} = \frac{1}{3} - \frac{1}{3}a_n$$

となる。ここで定常確率、つまり収束したときには $a_{n+1} = a_n = a$ とおけるので、

$$a = \frac{1}{3} - \frac{1}{3}a \quad \therefore a = \frac{1}{4}$$